



## EJERCITO ECUATORIANO

UNIDAD	UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR NO. 1 "ELOY ALFARO"	CÓDIGO	G.C.S.
NOMBRE	CIRCULAR VACUNA HPV		

**00106-2023-2024**

Estimado señor padre de familia/representante:

Con un cordial saludo, pongo en su conocimiento que esta semana se ejecutará la Campaña de Vacunación HPV, contra el Virus del Papiloma Humano por parte de personal profesional del Ministerio de Salud Pública. La vacunación se efectuará del 18 al 19 de junio, en horario de 08:00 a 13:00 a cadetes de sexo masculino de 9 años a 9 años 11 meses 29 días y cadetes de sexo femenino de 9 años hasta los 14 años 11 meses 29 días.

Para acceder a la vacuna es indispensable llenar y firmar la declaración/consentimiento anexa a la presente. No se pondrá la vacuna del Papiloma virus a niñas de 9 y 10 años de edad, a estudiantes vacunadas contra el virus del papiloma humano HPV en los meses de noviembre, diciembre del 2023, enero, febrero, marzo y abril del 2024. Independientemente de la dosis recibida.

Nota: Los padres de familia/representantes que no accederán y/o autoricen la vacuna deberán enviar firmada la declaración, misma deberá ser entregada al tutor de cada año.

DMQ, 17 de junio de 2024

Dios, Patria y Libertad

Carlos A. Mendieta M.  
Crnl. de E.M.C.  
Rector de la U. E. FF.AA. Colegio Militar No. 1 "Eloy Alfaro"

## DECLARACIÓN DE RENUNCIA A LA VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILLOMAVIRUS HUMANO (VPH).

### Lineamientos de Vacunación contra el virus del Papillomavirus Humano (VPH)

- La vacuna contra el virus del VPH cumple los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
- La vacuna contra el virus del VPH tiene autorización de uso en los niños/a mayores de 9 años de edad
- La población objetivo serán los niños de 9 años de edad y las niñas desde los 9 años hasta los 14 años 11 meses 29 días de edad.
- La vacuna contra el virus del VPH se encuentra dentro del esquema regular de vacunación.

### Ventajas de la vacunación contra el VPH

- Las vacunas reducen el riesgo de que una persona se infecte por el virus del VPH tipos 6, 11, 16 y 18. Los tipos de VPH 16 y 18 puede provocar cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de la boca, cáncer de oro faringe entre otros.
- La inmunización que proporcionará la vacunación de toda o gran parte de la población pueda reducirse de forma notable y duradera la transmisión de virus del VPH.
- La OMS, acreditan la seguridad y la efectividad de la vacuna contra el VPH.

### Reacciones adversas de la vacuna VPH

Como todos los medicamentos, las vacunas pueden producir reacciones adversas. La mayoría son leves y de breve duración y no siempre aparecen.

**Tabla No. 1. Reacciones adversas vacuna contra el virus VPH**

Eventos adversos sistémicos y del sitio de la inyección relacionados con a la vacuna
Evento adverso 1 a 5 días posvacunación Dolor en sitio de la punción 81% Hinchazón 24 % Eritema 24% Picazón 2%
Evento adverso 1 a 15 días posvacunación Fiebre 10%

**Fuente:** Gardasil MSD (1)

**Elaborado por:** Dirección Nacional de Inmunizaciones.

Una vez que he entendido claramente el procedimiento de vacunación y las posibles consecuencias posibles de la no administración de la vacuna, en ejercicio de la autonomía de manera libre y voluntaria no acepto recibir la vacuna contra el VPH.

.....  
Padre

.....  
Madre

.....  
Tutor legal

### **Y MANIFIESTO:**

- Que tengo atribuida la patria potestad de mí representado, por lo que ostento la autoridad legal para dar mi consentimiento para la no administración de la vacuna Gardasil a mí representado menor de edad.
- Que entiendo los riesgos y beneficios conocidos y potenciales de la enfermedad del VPH, de los que se me informa en este documento.
- Que entiendo que tengo la opción de aceptar o rechazar la vacuna en nombre de mi representado.
- Me considero responsable de esta decisión. Asimismo, sé que puedo reconsiderarla y solicitar la vacunación de mi hijo en cualquier momento.

# 5 razones

para vacunar contra el  
virus del papiloma humano (VPH)



Cada hora cuatro mujeres mueren en la Región de las Américas por cáncer cervicouterino, enfermedad causada por el VPH. La mayoría de las personas se infectarán con el VPH durante su vida.

1

2

La vacuna contra el VPH es segura y eficaz. Una dosis protege a las niñas contra el cáncer cervicouterino.

Se ha demostrado que recibir la vacuna contra el VPH entre los 9 y 14 años es más eficaz, antes de que las niñas estén expuestas a este virus de frecuente transmisión sexual, y así prevenir el cáncer cervicouterino.

3

4

La vacuna contra el VPH previene otros tipos de cáncer y verrugas de transmisión sexual causadas por este virus.

5

La vacuna se puede recibir al mismo tiempo que otras vacunas.

La mejor forma de prevenir el VPH es vacunarse. Se vacunará de forma gratuita en la institución educativa. Para más información, acude al Centro de Salud más cercano.

